

Alterações na terapia ortodôntica e na movimentação dentária oriundas da ação medicamentosa

Resumo

A medicação utilizada pelos pacientes pode repercutir na movimentação dentária ortodôntica, retardando ou acelerando a mesma. O profissional deve apresentar conhecimento prévio acerca das possíveis influências na movimentação dentária ortodôntica que podem ser ocasionadas pela prescrição medicamentosa utilizada pelos pacientes. Deve haver conscientização de que pode haver mudança nos padrões normais de movimentação para cada paciente analisado. O objetivo do presente artigo foi proceder a realização de uma revisão bibliográfica, realizando levantamento acerca de como a prescrição medicamentosa pode interferir na movimentação dentária ortodôntica. Existem algumas implicações relacionadas com o uso de medicamentos no decorrer da terapia ortodôntica que modificam a movimentação dentária. Pode-se empregar fármacos depois de instalada a aparatologia ortodôntica, no intuito de minimizar o desconforto proveniente das forças aplicadas, o que por sua vez poderá alterar a reabsorção óssea e a movimentação dentária, aumentando-as ou diminuindo-as. Além dessa circunstância, existe a aplicabilidade de medicamentos que é vital para os doentes durante seus tratamentos, prática que pode influir também na movimentação dentária ortodôntica. Para que seja possível realizar-se plano de tratamento ortodôntico e obter-se desfecho satisfatório é essencial analisar e investigar anteriormente se o paciente em atendimento utiliza medicamentos, advindo de que problemas de saúde e de que forma.

Palavras-chave: Anamnese. Ortodontia. Ligamento Periodontal. Remodelação Óssea. Preparações Farmacêuticas.